

四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

證治準繩卷二十二

詳校官太醫院恩禮臣表天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官進士臣朱鈴

校對官中書臣宋枋遠

謄錄監生臣李紳

欽定四庫全書

證治準繩卷二十二

類方

諸氣門

脹滿

大承氣湯

見大便不通

枳木湯

金匱

欽定四庫全書

證治準繩

明 王肯堂 撰

枳實

七枚

白朮

二兩

右㕮咀以水五升煮取三升分溫三服腹中軟即當

散也

防己椒蘆九

金匱

防己

椒目

葶蘆

灸

大黃

各一兩

末之蜜為丸桐子大先食飲服十九日三服稍增口

中自有津液渴者加芒硝五錢

厚朴七物湯

金匱

厚朴

半斤

甘草

大黃

各三兩

大棗

十枚

枳實

五枚

桂枝

三兩 生薑

五兩

水一斗煮取四升溫服八合日三服如嘔者加半夏

五合下利去大黃寒多者加生薑至半斤

黃芪湯

疑即黃芪建中湯

平胃散

見中食

雙解飲子

見癰

中滿分消丸

東垣

治中滿熱脹有寒者不治

黃芩

去腐炒夏月一兩二錢

黃連

淨炒各五錢

薑黃

白朮

人

參

去蘆 甘草

炙

猪苓

去皮各一錢

白茯苓

去皮

乾生薑

砂

仁

各二錢

枳實

炒

半夏

湯泡各五錢

厚朴

薑製一兩

知母

炒四錢

澤瀉

陳皮

各三錢

右除茯苓澤瀉生薑外共為細末入上三味和勻湯

浸蒸餅為丸如桐子大每服一百丸焙熱白湯下食

後服量病人大小加減

中滿分消湯

東垣

治中滿寒脹

黃芪

吳茱萸

厚朴

草豆蔻仁

黃檗

各五分

益智仁

半夏

茯苓

木香

升麻

各三分

人參

青皮 當歸 黃連 澤瀉 生薑 麻黃不去節

柴胡梢 乾薑 川烏 萆澄茄

各二分

水二盞煎至一盞去滓稍熱服食前大忌房勞酒麵
生冷硬物油膩

廣茂潰堅湯

東垣

廣茂

煨

黃連

柴胡

去蘆

甘草

生用

神麴

炒

澤瀉

各三分

陳皮

去白

吳茱萸

湯泡

青皮

去白

升麻

各二分

黃芩

去黑皮

草

豆蔻仁

煨

厚朴

薑製

當歸梢

益智仁

各五分

紅花

二分

半夏七分如渴加葛根四分

水二鍾先浸藥少時煎至一鍾稍熱服忌酒濕麵

半夏厚朴湯

半夏一錢厚朴八分炒六分當歸梢 猪苓 京三稜

升麻各四分肉桂 蒼朮 白茯苓 澤瀉 橘皮

生黃芩 草豆蔻仁 生甘草 柴胡各三分 木香

青皮各二分 吳茱萸 乾生薑 黃連各一分 紅花

蘇木各半 桃仁七個 昆布少許 渴加葛根三分

水二鍾煎至一鍾去查稍熱服二服後前證又減一半却於前藥中加減服之

通幽湯 潤腸丸

俱見大便不通

沉香交泰丸

沉香 橘紅 白朮

各三錢

厚朴

薑製五錢

吳茱萸

湯泡各一錢

實麩炒

青皮去白

木香

白茯苓

澤瀉

當歸

各二錢

大黃

酒浸一兩

右為細末湯浸蒸餅為丸桐子大每服五十丸加至

七八十九溫湯下微利為度

木香順氣湯

寶鑑

治濁氣在上則生瞋脹兩脇刺痛脉

弦而細者

木香 蒼朮

草豆蔻

麵裹煨各三分

厚朴

製四分

青皮

益智仁 陳皮

澤瀉

白茯苓

去皮

半夏

乾生

薑 吳茱萸

湯泡各二分

當歸

人參

各五分

升麻

柴

胡

去蘆各一錢

水二盞煎至一盞去渣溫服食前忌生冷硬物

木香塌氣丸 治中滿腹脹下焦虛損者

蘿蔔子

炒

陳皮

去白各五錢

胡椒

二錢

草豆蔻

炒

木香

青皮

各三分

蝎梢

去毒二錢半

右為細末麵糊為丸如桐子大每服三十九溫米飲下忌油膩服白粥百日重者一年小兒丸如麻子大桑白皮湯下十九日三服大人陰囊紅腫冰冷須用青鹽乾薑白麵各三錢水和膏攤紙上塗貼

元戎木香塌氣丸 治單腹脹

丁香

胡椒

各二錢

郁李仁

四錢

蝎尾

木香

檳榔

各半兩

枳實

白牽牛

各一兩

右為細末飯丸菜豆大每服十九至十五丸陳皮生薑湯送下

木香散 治單腹脹

木香

青皮

白朮

薑黃

草豆蔻

各半兩

阿魏

革澄茄

各一兩

右為細末醋糊丸如菜豆大每服二十九生薑湯送下

藿香正氣散

見中風

五隔寬中散

見反胃

木香流氣飲 沉

香降氣湯

俱見氣

香砂調中湯

治飲食所傷脾胃嘔吐胸滿噎噫或胸

腹脹痛

藿香

砂仁

各一錢二分

蒼朮

二錢米泔浸一宿炒

厚朴

薑製陳皮

半夏 茯苓 青皮

枳實

麸炒各一錢

甘草

三分大便

瀉去枳實青皮加麴
蘗山查肉果黃連

水二鍾薑三片煎八分食前服

分心氣飲

紫蘇梗

半錢

青皮

芍藥

大腹皮

陳皮

各一錢

木通

半夏

各八分

官桂

六分

赤茯苓

桑皮

炒各五分

水二鍾薑三片燈心十莖煎八分食前服

紫蘇子湯

濟生

治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促

煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊瀉

真紫蘇子

炒搥碎一錢

大腹皮

草菓仁

半夏

製厚

朴

製陳皮

去白

木香

木通

白朮

枳實

各一錢

人參

五

甘草

炙三分

水一鍾半薑五片煎八分食遠服

大橘皮湯

橘皮

厚朴

薑製各一錢半

猪苓

澤瀉

白朮

各一錢二分

檳榔

赤茯苓

陳皮

半夏

蒼朮

藿香

白茯苓

各一錢

木香

五分

滑石

三錢

水二鍾薑三片煎八分食前服

大異香散

三稜 蓬朮 青皮 半夏麴 陳皮 藿香

桔梗

枳殼

炒

香附

炒

益智

各一錢半

甘草

炙半錢

右分作二貼每貼用水二鍾生薑三片棗一枚煎至

一鍾去查食遠服

大半夏湯

半夏

湯泡

陳皮

茯苓

桔梗

檳榔

甘草

各等分

右剉碎每服三錢水一盞半生薑三片煎至八分去

滓食前溫服

人參芎歸湯

直指

治煩躁喘急虛汗厥逆小便赤大便

黑名血脹

人參 辣桂

去麤皮

五靈脂

炒各二錢五分

烏藥

蓬朮

煨

木香 砂仁

炙甘草

各半兩

川芎

當歸

半夏

湯泡各七

錢五分

右咬咀每服一兩五錢生薑五片紅棗二枚紫蘇四

葉煎空心服

七氣消聚散

香附米

一錢半

青皮

蓬朮

三稜

俱醋炒

枳殼

麸炒

香

砂仁

各一錢

厚朴

薑製 陳皮

各一錢二分

甘草

炙四分

水二鍾薑三片煎八分食前服

參朮健脾湯

人參

白茯苓

陳皮

半夏

縮砂仁

厚朴

薑製各一錢

白朮

二錢

炙甘草

三分

水二鍾薑三片煎八分服加麴蘖山查肉消脹尤妙

桃仁承氣湯

抵當湯

俱見畜血

當歸活血散

赤芍藥

生地黃

當歸鬚

酒洗各一錢半

桃仁

去皮炒

紅

花

酒洗

香附

童便浸各一錢

川芎

牡丹皮

玄胡索

蓬

朮

各八分炮

三稜

炮

青皮

各七分

水二鍾煎七分空心服

補中益氣湯

見勞倦

化滯調中湯

白朮

一錢五分

人參

白茯苓

陳皮

厚朴

薑製

山查

肉

半夏

各一錢

神麴

炒

麥芽

炒各八分

砂仁

七分

服甚者如

蘿蔔子炒一錢
麵食傷尤宜用

水二鍾薑三片煎八分食前服

參苓白朮散

見滯下

胃風湯

見下血

人參生脈散

見喘

葶藶大

棗瀉肺湯

見喘

小青龍湯

見嗽

枳殼散

本

治五種積氣三焦痞塞胃膈滿悶嘔吐痰

逆口苦吞酸常服順氣寬中除痞消積聚

枳殼

三棱

陳皮

益智仁

莢朮

檳榔

肉桂

各一兩

乾薑

厚朴

甘草

青皮

肉豆蔻

木香

各半兩

咬咀每服三錢水一盞薑棗同煎至七分熱服不拘時

索氏三和湯三倍加白朮方

白朮

厚朴

陳皮

各三兩

檳榔

紫蘇

各二兩

木通

甘草

海金沙

大腹皮

白茯苓

枳殼

各一兩

右水煎服

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝 生薑

各三兩

甘草

一兩

大棗

十二個

麻黃

細辛

各二兩 附子

一個

右七味以水七升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取二升分溫三服當汗出如蟲行皮中即愈

加味枳朮湯 治氣為痰飲所膈心下堅脹名曰氣分

歌云氣分中滿并胸痺三者雖殊皆此類胸痺氣實中滿虛氣分挾飲故為異跌陽微遲寸遲澀兩處推求病端的陰氣不通則骨疼陽氣不通身冷劇陰氣前通痺不仁陽氣前通惡寒慄陰陽相得氣乃行氣轉即散分虛實實則失氣虛遺尿腹滿脇鳴何以療心下堅大似旋盤桂附朮湯為最妙

枳殼

炒 麸

辣桂

紫蘇莖葉

陳皮

檳榔

桔梗

五靈脂

炒

白朮

木香

各二錢半

半夏

茯苓

甘草

各五錢

右以咀每服五錢水二盞生薑三片煎至一鍾去滓

食前溫服

調榮飲

治血分

見水腫

奪命丹

治瘀血入衣胞脹滿難下急服此藥即消衣

自下

附子

半兩
炮

牡丹皮

一兩
乾漆

一兩
碎之
炒令烟盡

右為細末好醋一升大黃末一兩同熬成膏和藥丸

如桐子大溫酒吞五七丸

黑神散

見鼻
切

椒仁丸 治先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通

血化為水

椒仁

甘遂

續隨子

去皮
研

附子

炮

郁李仁

黑

牽牛

炒

當歸

五靈脂

研
碎

吳茱萸

延胡索

各五
錢

芫花

醋浸一錢

蛭青

十枚去頭翅足同糯米炒黃去米不用

蟹螯

十枚去頭足翅

糯米炒黃去米

膽礬

信砒各一錢

石膏

二錢

右為末麵糊為丸如豌豆大每服一丸橘皮湯下此方藥雖峻厲所用不多若畏而不服有養病害身之患常治虛弱之人亦未見其有悞也

人參丸

治經脉不利化為水流走四肢悉皆腫滿名

曰血分其候與水相類若作水治之非也宜用此

人參

當歸

大黃

濕紙裏飯上蒸熟去紙切炒

桂心

瞿麥

穗赤芍藥

白茯苓

各半兩

葶藶

炒另研一錢

右為末煉蜜丸如桐子大每服十五丸加至二三十

丸空心飲湯下

晞露丸

寶鑑

治寒傷於內氣凝不流結於腸外久為癥

瘕時作疼痛腰不得伸

京三棱 蓬莪朮

二味各一兩並酒浸入巴豆三十粒切碎同炒深黃色去巴豆

不用乾漆

洗去腥炒烟盡

川烏

炮各半兩

礞砂

四錢另研

輕粉

一錢另研

茵

香青皮

鹽炒去雄黃另研

穿山甲

炒各三錢

麝香

五分另研

右為細末研勻生薑汁煮麵糊和丸如梧子大每服

二十九至三十九生薑湯送下溫酒亦得空心食前

木香通氣散

寶鑑

治寒氣結瘕腹大堅滿痛不可忍

木香

戎鹽

炒

京三稜

炮各半兩

厚朴

一兩薑製

枳實

麩炒甘

草

炙各三錢

乾薑

炮

蓬茂

炮各二錢

右為末每服三錢淡生薑湯調下食前

見明丸

寶鑑

治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕聚堅

大久不消者

附子

炮去皮
臍四分

鬼箭羽

紫石英

各三錢

澤瀉

肉桂

玄胡索

木香

各二錢

檳榔

二錢半

血竭

一錢半
另研

水蛭

一錢炒
烟盡

京三棱

五錢
剉

桃仁

三十粒湯浸去
皮尖麤炒研

大黃

二錢

剉用酒同三
棧浸一宿焙

右十三味除血竭桃仁外同為末入另研二味和勻

用元浸藥酒打糊丸如桐子大每服三十九丸淡醋湯

送下食前溫酒亦得

和血通經湯

寶鑑

治婦人室女受寒月事不來惡血積

結堅硬如石

當歸

京三棱

炮各五錢

廣茂

炮

木香

熟地黃

肉

桂

各三錢

紅花

貫衆

蘇木

各二錢

血竭

一錢另研

右十味除血竭外同為細末和勻每服三錢熱酒一盞調下食前忌生冷及當風大小便

附方

小溫中丸

丹溪

治脹是脾虛不能運化不可下之

陳皮

半夏

湯泡去皮臍

神麴

炒

茯苓

各一兩

白朮

二兩

香

附子

不要烘晒

針砂

各一兩半醋炒紅

苦參

炒

黃連

炒各半兩

甘草

三錢

右為末醋水各一盞打糊為丸如桐子大每服七八
十丸白朮六錢陳皮一錢生薑一片煎湯吞下虛甚
加人參一錢各用本方去黃連加厚朴半兩忌口病
輕者服此丸六七兩小便長病重服一斤小便始長
禹餘糧丸三因 治十種水氣脚膝腫上氣喘滿小便不
利但是水氣悉皆主之

許學士及丹溪皆云此方治脾脹之要藥

蛇含石

大者三兩以新銚盛入炭火中燒蛇黃與銚子一般紅用銚取蛇黃傾入醋中候

冷取出
研極細

禹餘糧石

三兩

真針砂

五兩先以水淘淨炒乾入餘糧一處用米

醋二升就銚內煮醋乾為度後用銚并藥入炭中燒紅銚出傾藥淨磚地上候冷研細

以三物為主其次量人虛實入下項

治水多是取轉惟此方三物既

非大戟甘遂芫花之比又有下項藥扶持故虛人老人亦可服

羌活

木香

茯苓

川芎

牛膝

酒浸

桂心

白

豆蔻

炮

大茴香

炒

蓬朮

炮

附子

炮

乾薑

炮

青皮

京三棱

炮

白蒺藜

當歸

酒浸一宿各半兩

右為末入前藥拌勻以湯浸蒸餅揆去水和藥再杵
極勻丸如桐子大食前溫酒白湯送下三十丸至五
十九最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服
藥即於小便內旋去不動藏府病去日日三服兼以
溫和調補氣血藥助之真神方也

木香化滯散 破滯氣治心腹滿悶

木香 薑黃 青皮 去白 縮砂仁 去殼 人參 檳榔

白朮 各二錢 白豆蔻 去殼 藿香葉 橘皮 大腹子

白茯苓

去皮

白檀香

桔梗

各五分

甘草

炙四分

右為細末每服三錢水一盞半煎至一盞稍熱服食
前沸湯點服亦可忌生冷硬物

導氣丸

治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便結秘小

腸腎氣等疾功效尤速

青皮

用水蛭等分同炒赤去水蛭

莪朮

用蜚虫等分同炒赤去蜚虫

胡椒

茴香

炒去

三棱

乾漆炒去乾漆

檳榔

班獼猴炒去班獼猴

赤芍

川椒炒去川椒

乾薑

炒

礞砂炒
附子

青鹽炒

茱萸

牽牛炒

石菖蒲

桃仁炒

去桃仁

右各等分剉碎與所製藥炒熟去水蛭等不用祇以青皮等十味為細末酒糊為丸如梧桐子大每服五十丸加至七十九空心用紫蘇湯送下

三稜煎丸 治心腹堅脹脇下滿硬胃中痞塞喘滿短

氣常服順氣消積滯除膨脹

京三稜

生半斤搗為細末以酒三升於銀石器內熬成膏

杏仁

湯泡去皮尖炒令黃

色

乾漆

炒烟盡

麥蘖

炒以上各三兩

青皮

去白

蘿蔔子

炒

神麴

妙以上各二兩

礞砂

飛研一兩

右為細末以三稜膏和丸如桐子大每服二十九食
後溫米飲送下

沉香散 治腹脹氣喘坐卧不得

沉香

木香

各二錢半

枳殼

麸炒

蘿蔔子

炒各三錢

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾不拘時服

溫胃湯

治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大腸與胃

氣不平脹滿上衝欬食不下脉虛而緊瀉

附子

炮去皮臍

厚朴

去皮生用

當歸

白芍藥

人參

甘

草

灸

橘皮

各一錢半

乾薑

一錢一分

川椒

去閉口炒出汗三分

右作一服水二鍾薑三片煎至一鍾食前服

木通飲 治脇肋刺痛膨脹小便赤澀大便秘不利或浮腫

木通

陳皮

紫蘇莖

甘草

各三錢

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚燈心十莖煎至一鍾不拘時服

參香散

治一切氣脾虛作脹痞氣

人參

官桂

甘草

各七分

桑白皮

桔梗

陳皮

枳殼

炒 麩

麥門冬

青皮

大腹皮

半夏

各一錢

蘇

子

茯苓

香附子

木香

各一錢二分

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食

前服

平肝飲子

治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹

滿頭眩嘔逆脉來浮弦

防風

去蘆

枳殼

炒 麩

桔梗

去蘆

赤芍藥

桂枝

各一錢半

木香

不見火

人參

檳榔

川芎

當歸

陳皮

甘草

炙各
八分

右作一服水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服

強中湯 治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成脹滿
有妨飲食甚則腹痛

人參

青皮

去白

丁香

各二錢

白朮

一錢半

附子

炮去皮臍

草

果仁

乾薑

炮各一錢

厚朴

薑製

甘草

炙各五分

嘔加半夏傷麵加萊菔子各一錢水二鍾薑三片紅
棗二枚煎一鍾不拘時服

甘露散 腫脹用下藥得利後以此補之

人參

白朮

茯苓

猪苓

各半兩

滑石

六兩

澤瀉

甘草

各一錢

右為細末每服三錢食前白滾湯調下

敷藥 治腹滿緊硬如石或陰囊腫大先用甘草嚼後用此

大戟

芫花

甘遂

海藻

各等分

右為細末用醞醋調麴和藥攤於綿紙上覆貼腫處

仍以輭絲裏住

積塊丸

治癥瘕積聚癖塊一應難消難化腹中飽脹

或蟲積疼痛皆能取效如神不傷元氣

京三棱

莪朮

各用醋煨

自然銅

蛇含石

各燒紅醋淬十次以

上各二錢

雄黃

蜈蚣

全用焙燥各一錢二分

木香

一錢半

鐵華粉

用糯米醋炒一錢

辰砂

沉香

各八分

冰片

五分

蘆薈

天竺

黃阿魏

全蝎

洗全用焙乾各四錢

右為極細末用雄猪膽汁煉為丸黑狗膽汁尤妙九

如梧桐子大每服七八分重者一錢五更酒送下塊
消即止不必盡劑

孫一奎曰予在吳下時有吳生諱震者博雅君子也
一日偶談及鼓脹乃詰予曰鼓有蟲否乎予卒不敢
應俛思久之對曰或有之本事方云臍腹四肢悉腫
者為水但只腹脹而四肢不甚腫者為蟲註謂鼓即
鼓脹也由是參之古人曾以蠱鼓同名矣且蠱以三
虫為首豈無旨哉愚謂鼓脹即今云氣虛中滿是也

以其外堅中空腹皮綑急有似於鼓故以鼓脹名也
彼蟲證者中實有物積聚已久理或有之吳生曰子
質何其敏也予堂嫂病鼓三載腹大如箕時或脹痛
四肢瘦削三吳名劑歷嘗不瘳吳俗死者多用火焚
燒至腹忽響聲如炮人皆駭然乃見蟲從腹中爆出
高二三丈許燒所之天為昏俄而墜地細視之皆虵
也不下千萬數大者長尺餘蟲腹中復生小蟲多者
十五六條或十數條或五六條蟲在人腹中蕃息若

此曷不令人脹哉惜乎諸書未有言及者予聞之恍然如夢始覺然猶未親見其異也歲萬厯癸巳赴督漕理刑吳比部之召而至淮陰有王鄉宦者其子年十六新娶後腹脹大按之有塊形如稍小四肢瘦削發熱晝夜不退已年半矣醫惟以退熱消脹之劑投之其脹愈大其熱愈熾喉中兩耳俱瘡余診視之脉滑數望其唇則紅其腹則疼又多嗜肥甘余思諸凡腹疼者唇色淡不嗜飲食今若此者得非蟲乎投以

阿魏積塊丸服之果下蟲數十大者二一紅一黑長尺餘蟲身紅線自首貫尾蟲腹中有蟲大者數條小者亦三四條蟲下則熱漸減脹漸消三下而愈益信前聞之不虛也

積聚

大七氣湯 治積聚癥瘕隨氣上下心腹疝痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

京三稜

蓬莪朮

青皮

陳皮

各去白

藿香葉

桔梗

肉桂

不見火

益智仁

各一兩半

甘草

炙七錢半

香附

炒去

毛一兩半

哎咀每服五錢水二盞煎至一盞食前溫服

肥氣丸

東垣

治肝之積在左脇下如覆杯有頭足久不愈

令人咳逆痞瘕連年不已其脉弦而細

柴胡

二兩

黃連

七錢

厚朴

半兩

椒

炒去汗去目及閉口者四錢

甘草

炙三

錢

廣茂

炮

昆布

人參

各二錢半

皂角

去皮弦子煨

白茯苓

去皮各一錢半

川烏

炮去皮臍

一錢二分

乾薑

各五分

巴豆霜

各五分

右除茯苓皂角巴豆外為極細末再另研茯苓皂角為細末和勻方旋旋入巴豆霜和勻煉蜜丸如桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加至大便微溏再從兩丸加服周而復始積減大半勿服在後積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在各條下秋冬加厚朴一半通前重一兩減黃連一錢半若治風癰於一料中加人參茯苓菖蒲各三錢黃連只依春夏用七錢雖秋冬不減淡醋湯送下空心服

加減肥氣丸

東垣

春夏合此治同前

柴胡

厚朴

人參

乾薑

各半兩

川烏

巴豆霜

各三錢

肉桂

二錢

黃連

一兩

川椒

甘草

各五分

右除巴豆霜外同為細末旋入巴豆研勻煉蜜丸如

梧子大初服二丸一日加一丸二日加二丸漸加至

大便秘澀再從二丸加服淡醋湯下空心服 秋冬

去生薑半錢加厚朴一倍減黃連一半

三因肥氣丸

當歸頭

蒼朮

各一兩半

青皮

一兩炒

蛇含石

火煨醋淬七錢半

三稜

蓬朮

鐵孕粉

各三兩與三稜蓬朮同入醋煮一伏時

右為末醋煮米糊丸如菉豆大每服四十九用當歸

浸酒下食遠服

鼈甲丸

治肥氣體瘦無力少思飲食

鼈甲

一枚可用重四兩者淨洗以醋和黃泥固濟背上可厚三分令乾

京三稜

炮

枳殼

麸炒微黃去瓢各三兩

川大黃

剉炒二兩

木香

不見火

桃仁

湯

去皮尖雙仁者用
黃細研如膏各一兩半
麸炒微

右除鼈甲外搗為細末後泥一風爐子上開口可安
鼈甲取前藥末并桃仁膏內鼈甲中用好米醋二升
時時旋取入鼈甲內以慢火熬令稠取出藥却將鼈
甲淨洗去泥焙乾搗為細末與前藥同和搗為丸如
梧桐子大每服二十九空心溫酒送下晚食前再服
息資丸

東垣

治肺之積在右脇下覆大如杯久不已令

人酒漸寒熱喘嗽發肺癰其脉浮而毛

厚朴

薑製八錢

黃連

炒一兩三錢

人參

去蘆二錢

乾薑

炮

白茯苓

去皮
梢末

川椒

炒去
汗

紫苑

去皮各
一錢半

桂枝

去
皮

桔梗

京

三稜

炮

天門冬

陳皮

川烏

炮去
皮臍

白豆蔻

各一
錢

青皮

五分

巴豆霜

四分

右除茯苓巴豆霜旋入外餘藥共為細末煉蜜丸如
桐子大每服二九一日加一九二日加二九加至大
便微溏再從二九加服煎淡薑湯送下食遠周而復
始積減大半勿服秋冬加厚朴五錢通前一兩三錢
黃連減七錢用六錢

加減息賁丸

東垣

仲夏合此其積為病寒熱喘咳氣上

奔脉瀉失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒熱相參
氣分寒血分熱治法宜益元氣洩陰火破氣削其堅
也

川烏

乾薑

白豆蔻

桔梗

各一錢

紫苑

厚朴

川椒

炒去汗

天門冬

去心京

三稜

枳殼

各一錢半

人參

桂枝

各二錢

陳皮

八錢

黃連

一兩三錢

巴豆霜

四分

紅花

少許青

皮

七分

右為末湯泡蒸餅為丸如桐子大初服二九一日加
一九二日加二九加至大便秘澀為度再從二九加
服煎生薑湯送下食前忌酒濕麵腥辣生冷之物

三因息賁湯

半夏

湯泡

桂心

人參

去蘆

吳茱萸

湯泡

桑白皮

炙

葶藶

炙甘草

各一錢半

右作一服用水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾

食前服

半夏湯 治肺積息賁咳嗽

半夏

湯泡去滑焙乾

細辛

去苗葉

桑根白皮

炙

前胡

去蘆各一兩半

桔梗

炒

貝母

去心

柴胡

去苗

訶梨勒

煨去核

人參

去蘆

白朮

炙甘草

各一兩

右咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破同煎至七分去滓溫服食後臨卧各一服

枳實散

治息賁氣腹脇脹硬欬嗽見血痰粘不利

枳實

銚炒

木香

檳榔

赤茯苓

去皮

五味子

甜葶

蘆

隔紙炒
今紫色

訶梨勒

去核

甘草

微炙各
半兩

杏仁

一兩湯洗
去皮尖雙

仁鉄炒
黃色

右咬咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓溫服不拘時

伏梁丸

東垣

治心之積起臍上大如臂上至心下久不

愈令人煩心其脉沉而乳

黃連

去鬚一
兩半

人參

去蘆

厚朴

去麁皮薑
製各半兩

黃芩

三錢

肉桂

茯神

去皮
炒各一錢

川烏

炮去
皮臍

乾薑

炮

紅豆

菖蒲

巴豆霜

各五分

右除巴豆霜外為末另研巴霜旋入和勻煉蜜為丸
如桐子大初服二九一日加一九二日加二九漸加
至大便微澹再從二九加服淡黃連湯下食遠周而
復始積減大半勿服秋冬加厚朴半兩通前共一兩
減黃連半兩只用一兩黃芩全不用

三因伏梁丸

茯苓

去皮

人參

去蘆

厚朴

去蘆皮

薑製炒

枳殼

去瓢

炒

三稜

煨

半

夏

湯泡
七次

白朮

各等
分

右為細末麵糊丸如梧子大每服五十九食遠用米

飲湯下

乾漆丸 治伏梁氣橫在心下堅牢不散胃中連背多疼

乾漆

搗碎炒
烟盡

芫花

醋拌
炒

鼈甲

去裙襴
醋塗炙

礞砂

研已上
各一兩

桃仁

去皮尖
麸炒

木香

不見
火

川烏頭

去皮臍剉鹽拌
炒黃各半兩

雄

黃

細研
麝香

研各二
錢半

右為細末入別研藥令勻醋煮麵糊為丸如菜豆大

每服十九食前用溫酒送下

半夏散 治伏梁積心下硬急滿悶不能食胃背疼痛

半夏

湯泡
去滑

鼈甲

醋炙各
一兩半

川大黃

剉炒

訶梨勒皮

桂

心

當歸

焙

前胡

青橘皮

去白

檳榔

木香

京

三棱

炮各
一兩

右為末每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不拘時稍熱服

治伏梁氣在心下結聚不散

用桃奴三兩為末空心溫酒下桃奴是實著樹不落者正月採樹上乾桃是也

痞氣丸

東垣

治脾之積在胃脘腹大如盤久不愈令人

四肢不收發黃疸飲食不為肌膚其脉浮大而長

厚朴

製半兩

黃連

去鬚八錢

吳茱萸

洗三錢

黃芩

白朮

各二

錢

茵陳

酒製炒

縮砂仁

乾薑

炮各半錢

白茯苓

另為末

人

麥

澤瀉

各一錢

川烏

炮去皮臍

川椒

各五分

巴豆霜

另研

桂

各四分

右除茯苓巴豆霜另研為末旋入外餘藥同為細末
煉蜜丸桐子大初服二九一日加一九二日加二九
漸加至大便微澇再從二九加服淡甘草湯下食遠
周而復始積減大半勿服

加減痞氣丸

東垣

孟秋合此

厚朴

一錢

黃芩

酒製

黃連

酒製

益智仁

當歸尾

橘皮

去白附子

各三分

半夏

五分

吳茱萸

青皮

澤瀉

茯苓

苓

神麴

炒

廣茂

昆布

熟地黄

人參

炙

甘草

巴豆霜

葛根

各二分

紅花

半分

右為細末蒸餅為丸如桐子大依前服法

三因痞氣丸

赤石脂

火煨醋淬

川椒

炒去汗

乾薑

炮各二兩

桂心

附子

各半

兩大烏頭

炮去皮臍二錢半

右為細末煉蜜和丸如梧子大以硃砂為衣每服五十丸食遠米湯下

蒜紅丸

治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐卧不得者

丁香 木香 沉香 縮砂仁 青皮

去白

檳榔

陳皮

去白

蓬莪朮

草果

去皮

牽牛

各一兩

粉霜

肉豆

寇

麴裏煨 各一錢

白茯苓

去皮

人參

各半兩

蒜

二百緡半生用半火煨熟

右為細末以生熟蒜研膏生絹紋取汁和藥為丸如

梧子大每服五七丸加至十五丸食後淡鹽湯送下

忌鹹酸魚鮓茶醬淹藏鷄鴨生冷馬牛雜肉之類只

可食淡白粥百日

鼈甲丸 治痞氣當胃脘結聚如杯積久不散腹脇疼

痛體瘦成勞不能飲食

鼈甲

三兩去裙襴以米醋一小盞化礱砂一兩用塗鼈甲炙以醋盡為度

附子

炮去皮臍

京三棱

炮

乾漆

搗碎炒烟盡

木香

各一兩

吳茱萸

半兩湯泡燉炒

川大黃

二兩搗碎醋拌炒令乾

右為細末醋煮麵糊丸如桐子大每服二十九空心溫酒送下

勻氣湯 治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食

陳麴

炒

麥蘖

炒

桂心

去麁皮

郁李仁

半生半炒

厚朴

去麁皮蘖

汁白朮各一兩大腹子二枚連皮牽牛一兩半生半炒良薑炮半兩

甘草炙二兩

呖咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚擘破同煎至七分去滓食遠稍熱稍服日三

沉香飲子 治痞氣升降陰陽

沉香 木香 羌活 桑白皮微炒人參 獨活

白茯苓 紫蘇葉各等分

呖咀每服三大錢水一盞半生薑五片大棗二枚煎

至七分去滓食前溫服二滓又作一眼

奔豚丸

東垣

治腎之積發於小腹上至心下若豚狀或

上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣及治男子

內結七疝女子瘕聚帶下其脉沉而滑

厚朴

薑製七錢

黃連

炒五錢

苦楝子

酒煮三錢

白茯苓

另末澤瀉

菖蒲

各二錢

玄胡索

一錢半

附子

去皮

全蝎

獨活

各一錢

川烏頭

炮

丁香

各五分

巴豆霜

四分

肉桂

二分

右除巴豆霜茯苓另為末旋入外餘藥為細末煉蜜

九如梧子大初服二九一日加一九二日加二九漸
加至大便微溏再從二九加服淡鹽湯下食遠周而
復始積減大半勿服秋冬加厚朴半兩通前一兩二
錢如積勢堅大先服前藥不減於一料中加存性
牡蠣三錢疝帶下勿加如積滿腹或半腹先治其
所起是何積當先服本藏積藥諸疾自瘳是治其本
也餘積皆然如服藥人覺熱加黃連加服藥人
氣短加厚朴如服藥人悶亂減桂

三因奔豚湯

甘李根皮

焙

乾葛

川芎

當歸

白芍藥

黃

芩

甘草

炙各一錢半

半夏

湯泡七次二錢

右作一服水二鍾薑五片煎至一鍾食前服

沉香石斛湯

治腎藏積冷奔豚氣攻少腹疼痛上衝

胸脇

沉香 石斛

陳麴

炒各一兩

赤茯苓

去皮

人參

巴戟

去心桂心

五味子

微炒

白朮

芎藭

各七錢半

木香

肉豆蔻

各半兩

咬咀每服三錢水一盞生薑三片棗三枚擘破煎至

六分去滓食前熱服

木香檳榔散 治積氣不散結伏奔豚發即上衝心胸

令人喘逆骨痿少力

巴豆

去皮膜
出油研

人參

去蘆各
半兩

川烏

炮去皮臍半
兩加三錢

羌活

獨活 防風

各半兩

右為細末入巴豆研勻煉蜜丸如桐子大每服三九

漸加至五九七九生薑湯送下食後臨卧服有孕者

不宜服

此方分兩一依元板善本校定厚朴黃連下有分兩而無各字川烏乃云半兩加三錢不

知何謂考溫白丸方惟川烏二兩半餘藥各半兩亦恐有訛重於變古姑仍之

痔漏腸風酒下 赤白痢訶子湯下 膿血痢米飲湯

下 墮傷血悶四肢不收酒下 蛔蟲咬心檳榔湯下

氣噎憂噎荷葉湯下 打撲損傷酒下 中毒蒂灰

甘草湯下 一切風升麻湯下 寸白蟲檳榔湯下 霍

亂乾薑湯下 咳嗽杏仁湯下 腰腎痛豆淋酒下

陰毒傷寒溫酒下 吐逆生薑湯下 飲食氣塊麵

湯下 時氣井花水下 脾風陳皮湯下 頭痛水

下 心痛溫酒下 大小便不通燈心湯下 因物

所傷以本物湯下 吐水漿湯下 氣病乾薑湯下

木香 檳榔煨 磁石火煨 醋淬 訶梨勒去核 牡蠣 桂心

去麤 藳香子炒 芎藭 沉香 白芷炒各半 陳橘皮

湯浸去白

七錢半

右為細末每服二錢炒生薑鹽湯下

萬病紫苑丸

元戎

治臍腹久患痙癖如碗大及諸黃病

每地氣起時上氣衝心繞臍絞痛一切蟲咬十種水
病十種蠱病及反胃吐食嘔逆惡心飲食不消天行
時病女人多年月露不通或腹如懷孕多血天陰即
發又治十二種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與鬼
交頭多白屑或哭或笑如鬼魅所著腹中生瘡腹痛
服之皆效

紫苑

去苗土

菖蒲

九節者去毛

吳茱萸

湯洗七次焙乾

柴胡

去鬚

厚

朴

薑製一兩

桔梗

去蘆

茯苓

去皮

皂角

去皮炙

桂枝

乾薑

炮

黃連

去鬚八錢

蜀椒

去目及閉口者微炒出浮

小兒天吊風搖防風湯下防已亦可

小兒疳痢葱

白湯下

小兒乳後傷白湯下

月信不通紅花酒

下 婦人腹痛川芎酒下

懷孕半年後胎漏艾湯

下 有子氣衝心酒下

產暈痛溫酒下

血氣痛

當歸酒下

產後心腹脹滿豆淋湯下

難產益智

湯下

產後血痢當歸湯下

赤白帶下酒煎艾湯

下 解內外傷寒粥飲下 室女血氣不通酒下

子死腹中葵子湯下 又治小兒驚癇大人顛狂一

切風及無孕婦人身上頑麻狀如蟲行四肢俱腫呻

吟走痛等疾 楊駙馬患風氣衝心飲食吐逆遍身

枯瘦日服五丸至七丸至二十日瀉出肉塊如蝦蟆

五六枚白膿二升愈 趙侍郎先食後吐目無所見

耳無所聞服至五十日瀉青蛇五七條長四寸許惡

膿三升愈 王氏患大風病眉髮墮落手掌生瘡服

之半日瀉出癩蟲二升如馬尾長寸許後愈 李靈
患肥氣日服五九經一月瀉出肉鼈三枚愈 茹黃
門卒中風病發時服藥瀉出惡膿四升赤黃水一升
一肉蟲如亂髮愈 李知府妻楊氏帶下病七年月
崩不止骨痠著床日服五九至十九十五九取下膿
血五升黃水一升肉塊如鷄子狀愈此藥治一切萬
病如神唯初有孕者不宜服

溫白丸

和劑

治心腹積聚久癥癖塊大如杯碗黃疸宿

食朝起嘔吐支喘上氣時時腹脹心下堅結上來搶
心傍攻兩脇十腫水氣八腫痞塞翻胃吐逆飲食噎
塞五種淋疾九種心痛積年食不消化或瘧疾連年
不瘥及療一切諸風身體頑麻不知痛痒或半身不
遂或眉髮墮落及療七十二種風三十六種瘧尸疰
忤及癲癘及婦人諸疾斷緒不生帶下淋瀝五邪失
心憂愁思慮飲食減少月水不調及腹中一切諸疾
有似懷孕連年羸瘦困憊或歌或哭如鬼所使但服

此藥無不除愈即前萬病紫苑丸方減羌活獨活防
風易老治五積 肺息賁人參紫苑 心伏梁菖蒲
黃連桃仁 脾痞氣吳茱萸乾薑 肝肥氣柴胡川
芎 腎奔豚丁香茯苓遠志 俱於溫白丸內加之
萬病感應丸於上溫白丸內加羌活三棱甘遂

杏仁

防風

各一兩
五錢

威靈仙

一兩 却減蜀椒

厚朴丸

見反
胃

千金硝石丸

止可磨塊不令困人須量虛實

硝石

六兩

大黃

八兩

人參

甘草

各三兩

右為細末以三年苦酒

醋也

三升置器中以竹片作準

每入一升作一刻先入大黃不住手攪使微沸盡一

刻乃下餘藥又盡一刻微火熬便可丸如鷄子黃大

每服一丸如不用大丸作梧子大每服三十九服後

下如鷄肝米泔赤黑色等物下後忌風冷宜軟粥將

息

醋煮三棱丸

治一切積聚不拘遠年近日治之神效

京三稜

四兩醋煮炙竹刀切片晒乾

川芎

二兩醋煮微炙切片

大黃

半兩醋浸

濕紙裏煨過切

右為末醋糊丸如桐子大每服三十丸溫水下無時病甚者一月效小者半月效

神功助化散

太無

專治男子婦人腹中痞塊不拘氣血

食積所成此方之妙不可盡述

地扁蓄

瞿麥穗

大麥蘖

各五錢

神麴

二錢半

沉香

木香

各一錢半

甘草

五錢

大黃

二錢

右為細末淨依分兩和勻男以燈心淡竹葉二味等分煎湯及無灰酒同調服湯多於酒婦人用紅花燈心當歸等分煎湯及無灰酒同調服酒多於湯忌油膩動氣之物及房事一月藥須於黃昏服大小便見惡物為度

聖散子

寶鑑

治遠年積塊及婦人乾血氣

礱砂

大黃

各八錢

麥蘖

六兩炒取淨麵

乾漆

炒煙盡一兩

扁蓄

茴香

炒

檳榔

各一兩

婦人乾血氣加穿山甲

二兩炮

右為細末每服五錢臨卧溫酒調下仰卧此藥只在
心頭至天明大便如爛魚腸小便赤為驗藥並無毒
有神效小兒用一錢十五以上三錢空心服之更效
此按古本校定今綱目刻本礪砂
乃六兩大黃乃八兩豈不悞人

雞爪三稜丸

寶鑑

治五藏瘕癖氣塊

雞爪三稜

石三稜

京三稜

木香

青皮

去白

陳皮

去白各半兩

礪砂

三錢

檳榔

肉豆蔻

各一兩

右為細末生薑汁打麵糊為丸桐子大每服二十九

薑湯下空心臨卧各一服忌一切生冷硬粘物

礞砂煎丸

寶鑑

消磨積塊痞癖一切凝滯

黑附子

二枚各重五錢以上正坐安者炮裂去皮臍剉作芩子

礞砂 木香

各三錢

破故紙

隔紙微炒

草撥

各一兩

右將礞砂末用水一觔續續化開納在甕內火上熬乾為末安在附子釜內却用剉出附子末填蓋口用和成白麵裹約半指厚慢灰火內燒勻黃色去麵同木香等為細末卻用元裏附子熟黃麵為末醋調煮

糊為丸如桐子大每服十五丸至三十九生薑湯下

紅丸子

見傷飲食

削堅丸

治五積六聚氣結成塊食積癖瘕心腹脹滿

瘦悴少食

鼈甲

醋浸兩宿去裙襖再蘸醋炙黃取末秤

乾漆

搗碎炒令烟出取末秤

京三

稜

剉如半棗大好醋浸兩宿焙取末秤已上各二兩半

細松烟墨

燒去膠

肉桂

去麤皮

乾薑

炮沒藥

另研 蘿蔔子

乾鰕

去毒炒

胡椒

檳榔

木香

礪砂

通明者為末用湯內飛另研各半兩

乳香

另研粉

霜 另研 輕粉 各二錢半

為細末研勻好醋煮薄麵糊為丸如小棗豆大每服
二十九淡醋煎生薑湯送下日進二服夜間一服如
未利漸加丸數服微利即減

一賢散 消積塊進飲食

橘紅 一斤
甘草 四兩
鹽 半兩

右用水三四碗從早煮至夜以爛為度水乾則添水
晒乾為末淡薑湯調下有塊者加薑黃半兩同前藥

煮氣滯加香附二兩同煎藥煮氣虛者加沉香

半兩另入噤口痢加蓮肉二兩另入去心

妙應丸即控涎丹見行痺龍薈丸見脇痛

阿魏丸去諸積

山查肉南星皂角水浸半夏同南星浸麥芽神麴黃

連各一兩連翹阿魏醋浸貝母瓜蒌各半兩風化硝

石碱胡黃連白芥子各二錢半蘿蔔子蒸一兩

右為末薑汁浸炊餅一方加香附蛤粉治嗽

阿魏丸 去肉積

阿魏 山查肉

各一兩

連翹

五錢

黃連

六錢半

右三味為末以阿魏醋煮為丸如梧桐子大每服五
六十九食前用白湯送下脾胃虛者用白朮三錢陳
皮茯苓各一錢煎湯送下

導痰湯

五飲湯

俱見痰飲

散聚湯

三因

治九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作心

腹絞痛攻刺腰脇小腹膜脹大小便不利

半夏

湯洗七次

檳榔

當歸

各七錢半

陳皮

去白

杏仁

去皮尖

桂心

各二兩

茯苓

炙甘草

附子

炮去皮臍

川芎

枳殼

去穰麩炒

厚朴

薑製

吳茱萸

湯浸各一兩

每服四錢水一盞薑三片煎七分食前溫服大便不

利加大黃

沉香降氣散

見氣

蘇合香丸

見中風

宣明三稜湯

治癥瘕瘰癧積聚不散堅滿痞膈食不

下腹脹

京三稜

兩白朮

兩蓬朮

當歸

各半

檳榔

木香

各七錢半

右為末每服三錢沸湯調下

三聖膏

用石灰十兩細篩過炒紅急用好醋熬成膏入大黃末一兩官桂末半兩攪勻以瓦器封貯紙攤貼患處火烘熱貼大黃須錦紋者

阿魏膏 治一切瘡塊更服胡連丸

羌活 獨活 玄參 官桂 赤芍藥 穿山甲

大黃 白芷 生地黃 兩頭尖 天麻 各五錢 槐

柳桃枝

各三錢

紅花

四錢

木鼈子

二十枚去殼

亂髮

如鷄子大一團

右用香油二斤四兩煎黑去渣入髮煎髮化仍去徐徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香沒藥各五錢麝香三錢調勻即成膏矣攤貼患處內服九藥黃丹須用真正者效凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨

加減四物湯

東垣

治婦人血積

當歸

川芎

芍藥

熟地黄

廣茂

桂

去麋皮

京三稜

乾漆

炒烟盡
各等分

右為麤末每服二錢水二盞煎法如常

當歸丸

升

治婦人月經不調血積證

當歸

赤芍藥

川芎

熟地黄

廣茂

京三

稜

各半
錢

神麴

百草霜

各二
錢半

右為細末酒糊為丸桐子大溫水下

牡丹散

雲岐

治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛

牡丹皮 桂心 當歸 玄胡索 莪朮 牛

各一兩

膝 赤芍藥

各三兩

京三棱

一兩半

右為麤末每服三錢水酒各半盞煎服

化氣湯

三因

治息積

砂仁 桂心 木香 甘草 茴香 丁香皮

各二錢半

炙

炒

青皮 陳皮 乾薑 蓬朮 胡椒 沉香

炒

炮各半兩

各一

錢

右為細末每服二錢薑蘇鹽湯調下婦人醋湯下

痰飲

小煮金花丸

潔古

南星

半夏

各一兩
俱生用

天麻

伍錢

雄黃

二錢

白麴

三兩

右為細末滴水為丸每服五十九至百丸先煎漿水沸下藥煮令浮為度漉出淡漿水浸另用生薑湯下

防風丸

和劑

治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘

急目眩旋運心怔煩悶手足無力骨節疼痛痺言語謇

澀口眼瞤動神思恍惚痰涎壅塞昏憤健忘虛煩少睡

防風

洗

川芎

天麻

去苗酒浸一宿

甘草

炙各二兩

硃砂

半兩研水

飛

右為末煉蜜為丸每兩作十九以硃砂為衣每服一丸荆芥湯化服茶酒嚼下亦得無時

川芎丸

和劑

消風壅化痰涎利咽膈清頭目治頭痛旋

運心忪煩熱頸項緊急肩背拘倦肢體煩疼皮膚瘙

痺腦昏目疼鼻塞聲重面上遊風狀如蟲行

川芎

龍腦薄荷葉

焙乾各七十五兩

桔梗

一百兩

甘草

三

十五兩

防風

去苗二兩十五兩

細辛

洗五兩

右為細末煉蜜搜和每一兩半分作五十九每服一

丸臘茶清細嚼下食後臨卧

化痰玉壺丸

見頭痛

丹溪搜風化痰丸

人參

僵蠶

槐角

白礬

天麻

陳皮

去白荊

芥

各一兩

辰砂

半兩

湯浸四兩

右為末薑汁研蒸餅為丸除辰砂為衣每服四十九

薑湯下

小黃九

古潔

治熱痰咳嗽

南星

湯洗

半夏

湯洗

黃芩

各一兩

右為細末薑汁浸蒸餅為丸桐子大每服五七十九

生薑湯下食後

小柴胡湯

見寒熱

白朮丸

潔古

治濕痰咳嗽

南星

半夏

各一兩
俱湯洗

白朮

一兩
半

右為細末湯浸蒸餅為丸如梧子大每服五七十九

食後生薑湯下

玉粉丸

潔古

治氣痰咳嗽

南星

半夏

各一兩
俱湯洗

橘皮

去白
二兩

右為細末湯浸蒸餅為丸如桐子大每服五七十九

人參生薑湯下食後

桔梗湯

和劑

除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心下堅

痞短氣煩悶痰逆惡心飲食不下

桔梗

細剉微炒

半夏

湯洗七次薑汁製

陳皮

去白各十兩

枳實

麩炒赤黃

色五兩

右為麤末每服二錢水一中盞入薑五片同煎至七分去滓不拘時溫服

薑桂九

潔古

治寒痰咳嗽

南星

洗

半夏

洗

官桂

去麋皮各一兩

右為細末蒸餅為丸桐子大每服三五十九生薑湯送下食後痰而能食大承氣湯微下之痰而不能食厚朴湯主之

胡椒理中丸

和劑

治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘急逆

氣虛痞胸膈噎悶脇腹滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水不止

款冬花

去梗

胡椒

甘草

炙

葶藶

良薑

細辛

去苗

陳皮

去白

乾薑

各四兩

白朮

五兩

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三十九加至五十九溫湯溫酒米飲任服無時日二

吳茱萸湯

仲景

吳茱萸

洗一升

人參

三兩

生薑

六兩切

大棗

十二枚擘

右四味以水七升煮取二升去滓溫服七合日三服

桂苓朮甘湯

見短氣

十棗湯

見水腫

小胃丹

芫花

好醋拌勻過一宿於瓦器內不住手攪炒令黑不可焦

甘遂

濕麵裹長流水浸半

月煮晒乾

大戟

長流水煮一時再用
水洗晒乾各半兩

大黃

濕紙裏煨勿
令焦切焙乾

再以酒潤炒熟
焙乾一兩半

黃檗

炒三兩

右為末以白朮膏丸如蘿蔔子大臨卧津液吞下或
白湯送下取膈上濕痰熱積以意消息之欲利空心
服一方加木香檳榔各半兩

大青龍湯

仲景

麻黃

六兩
去節

桂枝

二兩去
麋皮

甘草

二兩
炙

杏仁

四十粒
去皮

生

薑

三兩
切

大棗

十二
枚擘

石膏

如鷄子大
碎如米

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥
煮取三升去滓溫服一升

小青龍湯

見咳
救

小半夏湯

見嘔
吐

澤瀉湯

仲
景

澤瀉

五
兩

白朮

二
兩

水二升煮一升分溫再服

倍朮丸

和
劑

治五飲一曰留飲停水在心下二曰澀飲

水在兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢飲水溢在膈

五曰流飲水在脇間漚漚有聲皆由飲水過多或飲
冷酒所致

白朮

二兩桂心

乾薑

各一兩

右為末蜜九每服二十九溫米飲下加至三十九食

前服

大五飲九

十金翼

遠志

去心

苦參

藜蘆

白朮

烏魚骨

甘遂

大黃

石膏

桔梗

五味子

半夏

湯泡

紫苑

前胡 芒硝 括蕒 桂心 肉蓯蓉 貝母

芫花 人參 當歸 茯苓 芍藥 大戟 葶

蘆 黃芩 各一兩 常山 甘草 薯蕷 厚朴 細

辛 各七錢半 巴豆 三十粒去皮心熬

右三十二味為細末煉蜜丸桐子大酒下三九日三服稍加之忌肉食生物飴飴冷水

五飲湯

海藏

治五飲最效

旋覆花 人參 陳皮 去白 枳實 白朮 茯苓

厚朴製 半夏製 澤瀉 猪苓 前胡 桂心 白

芍藥 炙甘草

已上各等分

右每一兩分四服薑十片水二盞煎至七分去滓溫服無時因酒成飲加葛根葛花砂仁

黃芩利膈丸

見痞

滾痰丸

養生主論

痰之為病成偏頭風成雷頭風成太陽

頭痛眩暈如坐舟車精神恍惚或口眼瞤動或眉稜耳輪俱痒或頷腮四肢遊風腫硬似疼非疼或渾身

燥痒搔之則癢疹隨生皮毛烘熱色如錦斑成齒頰
似痒似痛而疼無定所滿口牙浮痛痒不一或噯氣
吞酸鼻聞焦臭喉間豆腥氣心煩鼻塞咽嗑不利咯
之不出咽之不下或因噴嚏而出或因舉動而唾其
痰如墨又如破絮或如桃膠或如蜆肉或心下如停
水鐵閉滯妨悶噯噯連聲狀如膈氣或寢夢刑戮刀
兵劒戟或夢入人家四壁圍繞暫得一竇百計得出
則不知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣

撲鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼兩淚而寤或時郊行忽見天邊兩月交輝或見金光數道回頭無有或足膝酸軟或骨節腰腎疼痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戮乍起乍止並無常所或不時手臂麻疼狀如風濕或卧如芒刺不安或如毛蟲所螫或四肢不舉或手足重滯或眼如薑蜚膠粘痒澀開闔甚難或陰晴交變之時胸痞氣結閉而不發則齒痒咽痛口糜古爛及其奮然而發則噴嚏連聲初則涕

唾稠粘次則清水如注或眼前黑暗腦後風聲耳內
蟬鳴眼瞶肉惕治之者或曰腠理不密風府受邪或
曰上盛下虛或曰虛或曰寒或曰發邪惟洞虛子備
此疾苦乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交
紐噎塞煩鬱有如火火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰
涎涕淚並從肺胃間涌起凜然毛豎噴嚏千百然後
遍身煩燥則去衣凍體稍止片時或春秋乍涼之時
多加衣衾亦得暫緩或頓飲冰水而定或痛飲一醉

而寧終不能逐去病根乃得神秘沉香丸方屢獲大效愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之詩曰
甌裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相逢二八求斤
正硝煅青礞倍若沉十七兩中零半兩水九梧子意
須斟酌除驅怪病安心志水瀉雙身却不任

大黃

蒸少頃翻過再蒸少頃即取出不可過

黃芩

各八兩

青礞石

硝煅如金

色沉香

百藥煎

此用百藥煎乃得之方外秘傳蓋此丸得此藥乃能收斂周身

頑涎聚于一處然後利下甚有奇功曰倍若沉者言五倍子與沉香非礞倍于沉之謂也以上各五

錢

右為末水丸如梧子大白湯食後空心服 一切新
舊失心喪志或癲或狂等證每服一百丸氣盛能食
狂甚者加二十九臨時加減消息之 一切中風癱
瘓痰涎壅塞大便或通或結者每服八九十九或加
至百丸永無秘結之患 一切陽證風毒腳氣遍身
遊走疼痛每服八九十九未效加至百丸 一切無
病之人遍身筋骨疼痛不能名者或頭疼牙痛或搖

或痒風蛙等證風寒鼻塞身體或疼或不疼非傷寒
證者服八九十九痰盛氣實者加之 一切吞酸噯
逆膈氣及胸中疼悶腹中氣塊衝上嘔沫吐涎狀如
反胃心下恍忽如畏人捕怵惕不安陰陽闕格變生
乖證食飢傷飽憂思過慮心下嘈雜或痛或噦或晝
夜虛飽或飢不喜食急慢喉閉赤眼每用加減服
一切新舊痰氣喘嗽或嘔吐頭運目眩加減服之
一切顙領腫硬若瘰癧者及口糜舌爛咽喉生瘡者

每服六七十丸加蜜少許一處嚼碎嚙化睡時徐徐
嚙之曾有口瘡者服二三十丸依前法嚙之二三夜
瘡一切男婦大小虛實心疼連腹身體羸瘦發時
必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心下溫煖者量虛實
加減服之若事屬不虞之際至於百丸即便回生未
至顛危者虛弱疑似之間只服三十丸或五十丸立
見生意然後續續進之以瘡為度兼服生津化痰溫
中理氣之藥一切荏苒疾病凡男婦患非傷寒內

外等證或酒色過度或吐血或月事愆期心煩志亂
或腹脹脇痛勞倦痰眩或暴行日中因暑伏痰口眼
喎邪目痛耳憤鼻塞骨節酸疼乾嘔惡心諸般內外
疼痛百藥無效衆醫不識者依前法加減服之效大
抵服藥須臨卧在牀用熟水一口許嚥下便卧令藥
在喉膈間徐徐而下如日間病出不測疼痛不可忍
必欲急除者須是一依前卧法服大半日不可食湯
水及不可起身行坐言語直候藥九除逐上焦痰滯

惡物過膈入腹然後動作方能中病每夜須連進二
次次日痰物既下三五次者仍服前數下五七次或
直下二三次而病勢頓已者次夜減二十九頭夜所
服並不下惡物者次夜加十九人壯病實者多加至
百丸惟候虛實消息之或服過仰服咽喉稠粘壅塞
不利者痰氣泛上乃藥病相攻之故也少頃藥力既
勝自然寧帖往往病人結實於肺胃之間或只暴病
全無泛濫者服藥下咽即仰卧頓然百骸安靜五臟

清寧次早先去大便一次其餘遍數皆是痰涕惡物
看甚麼糞用水攪之盡是痰片粘涎或稍稍腹痛腰
腎拘急者蓋有一種頑痰惡物閉氣滑腸裏急後重
者狀如痢疾片餉即已若有痰涎易下者快利不可
勝言頓然滿口生津百骸爽快間有片時倦怠者蓋
因連日病苦不安一時為藥力所勝氣體暫和如醉
得醒如浴方出如睡方起此藥並不洞泄刮腸大瀉
但取痰積惡物自腸胃次第而下腹中糟粕並不相

傷其推下腸腹之糞則藥力所到之處是故先去其糞其餘詳悉不能備述服者當自知之

利痰丸

玄珠

南星

皂角

石膏

牽牛

頭末

芫花

已上各

二兩

右為細末用薑汁糊丸如梧子大每服一二十丸量人虛實用之薑湯下一方加青鹽

五錢

巴豆

少許

青礞

石

硝煨如金色五錢

若風痰壅塞此藥乃為先鋒服之痰即

已如寒不宜用

導痰丸

左珠

大半夏

六兩分作三分一分用白礬一兩為末浸水一分用肥皂角一兩為末浸水一分用

巴豆肉一百粒為末浸水

右件餘藥在下以半夏在上浸至十日或半月要常動水令二藥相透次相合處揀去巴豆并皂角將餘水以慢火煮令水乾取出半夏切搗碎晒乾或陰乾亦佳後入

甘遂

製

百藥煎

各二兩

全蠍

僵蠶

各一兩

右為細末薄糊丸如梧子大每服十九或十五丸亦
量人虛實白湯下

妙應丸即控涎丸

見行痺

祛風丸

寶鑑

有人喜食酸鹹酒色過節滲注成痰飲聚

於胸膈滿則嘔逆惡心涎流一臂麻木升則頭目昏
眩降則腰脚疼痛深則左癱右瘓淺則厥然仆地此
藥寬中祛痰搜風理氣和血駐顏延年益壽

半夏鈹

荊芥

各四兩

槐角子

炒

白礬

生

橘紅

硃

砂

各一兩

右為末薑汁糊丸每服五六十丸生薑皂角子仁湯

送下日三服

川芎丸

本事

治膈上痰

川芎

二兩細剉
慢火熬熟

川大黃

二兩蒸
令乾

右件焙乾為末用不蛀皂角五七挺溫水搥汁絹濾
出查瓦罐中熬成膏和前二味為丸如桐子大每服
十五丸小兒三丸薑湯下

保和丸

見傷食

消暑丸

見傷暑

蘇子降氣湯

見氣

導痰湯

生濟

治痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通

半夏

湯洗七次四兩

天南星

泡去皮

枳實

去瓢炒

赤茯苓

去皮橘

紅

各一兩

甘草

炙半兩

右咬咀每服四錢水一盞薑十片煎八分食後溫服

小半夏茯苓湯

和劑

半夏 茯苓

各等分

每服五錢水一盞半薑五片煎七分服無時

丁香五套丸

治胃氣虛弱三焦痞澀不能宣行水穀

故為痰飲結聚胃膈嘔吐惡心脹滿不食常服溫脾

順氣

方見肩背痛

二陳湯

和劑

治痰飲為患或嘔逆惡心或頭眩心悸或

中脘不快或食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之

半夏

湯洗七次

橘紅

各五兩

白茯苓

三兩

炙甘草

一兩半

右咬咀每服四錢水一盞薑七片烏梅一枚煎六分

不拘時熱服

青州白丸子

見中風

來復丹

見中暑

八神來復丹

濟生

硝石

一兩同硫黃為末磁器內以微火炒用柳篋攪不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣

末

太陰玄精石

飛研一兩

五靈脂

水澄清濾去砂石曬乾

青皮

去白

陳皮

去白各二兩

舶上硫黃

透明

沉香

木香

堅實者

天南

星

粉白者各一兩

右為末飛麵糊丸如梧桐子大每服三十九空心米

飲送下

八味丸

見虛勞

六君子湯

人參

白朮

茯苓

陳皮

製半夏

各一錢

炙甘草

草

五分

水二盞薑五片煎至一鍾去滓不拘時溫服

理中化痰丸

治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大

便不實飲食難化咳唾痰涎此屬中氣虛弱不能統

涎歸源也

人參

白朮

炒

乾薑

甘草

炙

茯苓

半夏

薑製

右為末水丸桐子大每服四五十九白湯下

補中益氣湯

見傷勞倦

七氣湯

見氣

越鞠丸

見鬱

附方

橘皮湯

治胸膈停痰

橘皮

茯苓

半夏

各一錢半

旋覆花

青皮

桔梗

枳殼

薑製

細辛

人參

各一錢

甘草

半錢

右作一服用水二鍾薑五片煎一鍾食遠服

前胡半夏湯 治痰盛

前胡

半夏

薑製

茯苓

各二錢

陳皮

木香

紫蘇

枳殼

甘草

各一錢

右作一服用水二鍾生薑三片烏梅一個煎至一鍾

食遠服

桔梗湯

治胸膈脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎沫

桔梗

炒

半夏

薑製

陳皮

去白各三錢

枳實

麩炒一錢半

右作一服水二鍾薑五片煎一鍾不拘時服

枇杷葉散 治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮

焙去白

草豆蔻

各半兩

前胡

枇杷葉

拭去毛炙黃

半

夏

湯泡

茯苓

去皮

人參

大腹皮

白朮

厚朴

去麤皮薑

汁炙各

一兩

右以咀每服四錢水一中盞生薑半分煎至六分去

滓不拘時熱服

旋覆花散 治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花

甘草

炙各半兩

枳殼

去瓢炙炒

石膏

細研各二兩

赤茯苓

苓 麥門冬

去心

柴胡

去苗

人參

各一兩

犀角屑

防風

去 黃芩

各七錢半

右咬咀每服五錢水一大盞生薑半分煎至五分去

滓食後良久溫服

化涎散

治熱痰利胸膈止煩渴

凝水石

煨研一兩

鉛白霜

另研

馬牙硝

另研

雄黃

另研各一錢

白

礬 甘草

各二兩半

龍腦

少許

右為細末研勻每服一錢不拘時水調下小兒風熱

痰涎用沙糖水調下半錢此藥太涼不可多服

辰砂化痰丸 治風痰安神志利咽膈清頭目

辰砂

飛研為衣

白礬

枯研各半兩

天南星

炮一兩

半夏麴

三兩

右為細末薑汁煮麵糊和丸如桐子大辰砂為衣每服三十九食後生薑湯下

半夏利膈丸 治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不利涕唾

稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胸脇引痛腹內有聲

半夏

湯洗三兩

白附子

生用二兩

白茯苓

去皮

白礬

生用

人參

去蘆

白朮

滑石

貝母

各一兩

天南星

生用一兩半

右為細末麵糊和丸如梧子大每服三十九食後薑

湯下

破痰消飲九 治一切停痰留飲

陳皮

去白

川薑

炮

京三棱

炮碎

草果

剉裏煨

良薑

濕紙裏煨

蓬朮

炮

青皮

各一兩

半夏

湯炮七次三兩

右為細末水煮麵糊和丸桐子大陰乾每服五十九

食遠薑湯送下

化痰鐵刷丸

治男婦風痰酒痰茶痰食痰氣痰一切

痰逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯膿聲如拽鋸並皆治之

此藥墜痰止嗽定喘

白附子

炮

南星

炮

半夏

洗

白礬

生用各半兩

寒水石

皂角

去子各一兩

乾薑

七錢半

礪砂

輕粉

各一錢

右為細末水煮麵糊和丸如梧子大每服二三十丸

食後用淡薑湯下

沉香墜痰丸

治宿食不消咽膈不利咳嗽痰涎頭目

昏暈嘔逆惡心胸膈不快

沉香 木香

各二錢

青皮

去白二錢半

檳榔

大者二枚用麪裹煨熟

半夏

曲二兩

右為細末用生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大每服二十丸不拘時薑湯下

茯苓丸

一名指迷茯苓丸

本治臂痛具指迷方中云有人臂痛

不能舉手足或左右時復轉移由伏痰在內中脘停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下

故上行攻臂其脉沉細者是也後人為臂痛乃痰證也但治痰而臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此而愈

半夏

二兩

茯苓

一兩

枳殼

去瓢殼

炒半兩

風化朴硝

二錢五分

如一時未

易成但以朴硝撒在竹盤中少時盛水置當風處即乾如芒硝刮取用亦可

右為細末生薑汁煮麵糊為丸如桐子大每服三十丸薑湯送下 累有人為痰所苦夜間兩臂如人抽搐兩手戰掉茶盞亦不能舉服此隨愈痰藥方多唯

此立見功效

神仙墜痰丸 治痰飲胸膈痞塞此藥下痰

皂角

無虫蛀者刮去皮弦酥炙黃色去子淨一兩六錢

白礬

一兩二錢生用

黑牽

牛

一斤取頭末四兩

為細末滴水丸梧子大每服三十九丸漸加至百九空心溫酒送下看病輕重者五日十日愈重者半月一月愈久服永無癰瘰之疾

搜飲丸 治證同前

木瓜一枚切下頂去瓢作確用生白礬半夏麴等分
為細末填木瓜內却用原頂蓋定麻縷紫縛於飯甑
上炊兩次爛研以宿蒸餅和丸如桐子大每服三五
十丸不拘時薑湯下

治懸飲心腹氣滯兩脇多疼

半夏

三兩搗為末

皂角

六兩三兩去黑皮酥炙令黃搗為末三兩去皮子搗碎以酒一

升接取汁去滓煎成膏將半夏以膏和作餅以青蒿蓋出青衣如造麴法搗羅為細末

旋覆

花
一兩木香

檳榔

各二兩

右為細末酒煮麵糊和丸如桐子大每服二十九食
前用薑湯下

破飲丸 治五飲停蓄胸膈呼吸之間痛引兩脇脹滿
氣促胸腹結為癥癖支滿胸膈旁及兩脇搶心疼痛
飲食不下反胃吐逆九種心疼積年宿食不消久瘧
久痢遺尸症忤顛癇厥運心氣不足憂愁思慮婦人
腹中諸病悉能治之

萆撥

丁香

火不見

縮砂仁

蝎梢

胡椒

木香

不見火

烏梅肉

青皮

巴豆

去皮膜
各等分

右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日濾出同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久細研為膏入藥末和勻丸如菉豆大每服五七丸臨睡生薑湯送下

八珍丸

治膈痰結實滿悶喘逆

丹砂

研半兩

犀角

鎊

羚羊角

鎊

茯神

去木

牛黃

研

龍腦

研各二錢

牛膽南星

礞砂

研各一兩

右為細末研勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九食

後細嚼人參荊芥湯下

鵝梨煎丸 治熱痰涼心肺利胸膈解熱毒補元氣

大鵝梨

二十枚去皮核用淨布絞取汁

薄荷

生半斤研汁

皂角

不蛀者十挺去

皮子漿水二升按取濃汁

白蜜

半斤

生地黄

半斤研取汁同上五味慢火熬膏和下藥

人參

白茯苓

皮去

白蒺藜

刺炒去

肉蓯蓉

酒浸切培乾

牛

膝

酒浸

半夏

湯泡

木香

各一兩

檳榔

二兩

防風

去

青橘皮

去白桔梗

炒

羌活

白朮

山藥

各七錢半

甘草

炙各半兩

右為細末同前膏拌勻杵令得所丸如梧子大每服

十五九加至二十九食後荊芥湯送下日二服

麝香丹砂丸 治痰熱咽膈不利頭目昏痛

麝香

另研

木香

丁香

犀角

甘草

炙各二錢半

龍腦

另研一錢

人參

藿香

去梗

牛膽南星

防風

去義

黃芪

各半

兩

麥門冬

去心七錢半

丹砂

另研一兩

右為細末煉蜜和丸如鷄頭實大每服一九食後嚼破用荊芥湯下

金硃化痰丸 治痰熱安神志除頭痛眩暈心忪恍惚

胸膈煩悶涕唾稠粘咳嗽咽嗑不利

皂角子仁

炒

天竺黃

另研

半夏

湯浸洗七次生薑二兩去皮同搗作餅炙

微黃白礬

透明者枯過另研以上各四兩

龍腦

另研半兩

辰砂

水飛研二兩

右將皂角仁半夏為末與諸藥研勻生薑汁煮麵糊丸如桐子大金箔二十片為衣每服十五丸加至二十五丸食後薑湯下

皂角化痰丸

東垣

治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉中不

利涕唾稠粘嗑塞吐逆不思飲食或時昏憤

皂角木白皮

炙酥

白附子

炮

半夏

湯洗七次

天南星

炮

白

礬

枯

赤茯苓

去皮

人參

各一兩

枳殼

炒二兩

右為細末生薑汁麵糊丸如梧子大每服三十九溫水送下食後

法製清氣化痰丸

順氣快脾化痰消食

半夏

南星

去皮

白礬

皂角

炒

乾薑

各四兩

右先將白礬等三味用水五碗煎取水三碗却入半夏二味浸兩日再煮至半夏南星無白點為度晒乾

陳皮

青皮

去穢

紫蘇子

炒

蘿蔔子

炒另研

杏仁

去皮尖炒

研

葛根

神麴

炒

麥蘖

炒

山查

香附

各二兩

右為末蒸餅丸桐子大每服五七十九臨卧食後茶

湯下

薛新甫曰一男子素厚味胸滿痰盛余以膏粱之人
內多積熱與此丸服之而愈彼見有驗修合餽送脾
胃虛者無不受害

飛礬丹

化痰神效

白礬

通明者
二兩枯

白殭蠶

一兩半用米
醋浸一宿炒

半夏

湯洗
七次

南星

各一兩切作片子用皂角一兩半去皮弦用水一小盃同熬水盡去皂角不用只用南星

細末薑汁糊丸如桐子大水丸亦可每服十五丸

至二十九薑湯下

又治喉閉用薄荷兩葉以新汲

水浸少時嚼薄荷吞藥用水送下嚥不得即用十五

丸搗細用皂角水調灌下即開 又治水兒急慢驚

風牙關緊急不可開者亦用皂角水調塗牙齦上入

咽即活

法製半夏

御藥

消飲化痰壯脾順氣

用大半夏湯洗泡七遍以濃米泔浸一日夜每半夏一兩用白礬一兩半研細溫水化浸半夏上留水兩指許頻攪冬月於煖處頓放浸五日夜取出焙乾用鉛白霜一錢溫水化又浸一日夜通七日盡取出再用漿水慢火煮勿令滾候漿水極熟取出焙乾以磁器收貯每服一二粒食後細嚼溫薑湯下又一法依前製成半夏每一兩用白礬水少許漬半夏細飛硃砂

末淹一宿欵乾焙用依前法亦可用生薑自然汁漬
焙用

神芎導水丸

心印
下同

黃芩

一兩

黃連

川芎

薄荷

各半
兩

大黃

二兩

滑石

黑牽牛

頭末各
四兩

河間製治一切熱證其功不可盡述設或久病熱鬱
無問瘦痿老弱并一切證可下者始自十九以為度
常服此藥除腸胃積滯不傷和氣推陳致新得利便

快並無藥燥搔擾亦不因倦虛損遂病人心意或熱甚必急須下者使服四五十九未效再服以意消息常服二三十九不動臟腑有益無損或婦人血病下惡物加桂半兩病微者常服甚者取利因而結滯開通惡物自下也凡老弱虛人脾胃經虛風熱所鬱色黑齒槁身瘦痿黃或服甘熱過度成三消等病若熱甚於外則肢體躁擾病於內則神志躁動怫鬱不開變生諸證皆令服之惟臟腑滑泄者或裏寒脈遲者

或婦人經病產後血下不止及孕婦等不宜服

十棗湯

見水腫

舟車神祐丸

甘遂

芫花

大戟

各一兩俱醋炒

大黃

二兩

黑牽牛

頭末四兩

青皮

陳皮

木香

檳榔

各半兩

輕粉

一錢

取蠱加

蕪荑

半兩

為末水丸空心服河間依仲景十棗湯例製出此方
主療一切水濕為病戴人云十棗洩諸水之上藥所

謂溫藥下者是已如中滿腹脹喘嗽淋閉水氣蟲腫
留飲癖積氣血壅滯不得宣通風熱燥鬱肢體麻痺
走注疼痛久新瘡痢等患婦人經病帶下皆令按法
治之病去如掃故賈同知稱為神仙之奇藥也緣此
方河間所定初服五九日三服加至快利後却常服
以病去為度設病愈後平人能常服保養宣通氣血
消運飲食若病痞悶極甚者便多服反煩滿不開轉
加痛悶宜初服二九每服加二九加至快利為度以

意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法加減至戴人變為神芎丸神秘不傳然每令病人夜臥先服百餘粒繼以濬川等藥投之五更當下種種病出投下少未再服和膈藥須以利為度有五日一下者三日一下者病輕者可二三度止重者五六度方愈是擒縱卷舒之妙臨證制宜非言可諭觀其藥雖峻急認病的確自非老手諳練有大負荷者焉敢見諸行事予每親製用之若合符節然

又隨人強弱當依河間漸次進服強實之人依戴人治法行之神效

大聖濟川散

大黃

煨

牽牛

取頭末

郁李仁

各一兩

木香

三錢

芒硝

三錢

甘

遂


半錢

評曰此下諸積之聖藥也諸濕為土火熱能生濕土故夏熱則萬物濕潤秋涼則濕復燥乾濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能宣通停滯而生水濕也

凡病濕者多自熱生而熱氣多為兼病內經云明知
標本正行無問者是也夫濕在上者目黃而面浮在
下者股膝腫厥在中者肢滿痞膈痿逆在陽不去者
久則化氣在陰不去者久則成形世俗不詳內經所
言留者攻之但執補燥之劑怫鬱轉加而病愈甚也
法當求病之所在而為施治瀉實補虛除邪養正以
平為期而已又嘗考戴人治法假如肝木乘脾土此
土不勝木也不勝之氣尋救于子已土能生庚金庚

為大腸味辛者為金故大加生薑使伐肝木然不開
脾土無由行也遂以舟車丸先通閉塞之路是先瀉
其所不勝後以薑汁調瀉川散大下之是瀉其所勝
也戴人每言導水丸必用禹功散繼之舟車丸必以
瀉川散隨後如寒疝氣發動腰脚膝急痛者亦當下
之以瀉其寒水世俗闕於治體一概鹵莽有當下而
非其藥終致委頓而已豈知巴豆可以下寒甘遂羌
花可以下濕大黃芒硝可以下燥如是分經下藥兼

食療之非守一方求其備也故戴人曰養生與攻病
本自不同今人以補劑療病宜乎不效是難言也



證治準繩卷二十二